

Programa de Educação Médica Continuada Atualizações em Alergia e Imunologia

Artigo de revisão

As questões abaixo deverão ser respondidas após leitura do texto “Reações adversas aos antiinflamatórios não esteroidais”. Para cada questão há apenas uma alternativa correta.

- 1. Quando o ácido araquidônico é metabolizado pela via da cicloxigenase, quais metabólitos são formados:**
 - a) lipoxinas e PGD₂.
 - b) tromboxanos e leucotrieno A₄.
 - c) leucotrienos cisteínicos e prostaglandinas.
 - d) tromboxanos e prostaglandinas.
- 2. Quais AINEs podem ser considerados inibidores fortes da COX-1:**
 - a) cetoprofeno e nimesulida.
 - b) dipirona e naproxeno sódico.
 - c) rofecoxibe e diclofenaco.
 - d) meloxicam e piroxicam.
- 3. Na asma induzida por aspirina é correto afirmar:**
 - a) faz parte da tríade de Samter, juntamente com sinusite crônica e urticária pelos salicilatos.
 - b) é mais comum em mulheres e em caucasianos.
 - c) história familiar é um importante fator de risco.
 - d) raramente acomete crianças asmáticas pré-escolares.
- 4. Em relação à patogênese da asma induzida por aspirina:**
 - a) as reações por AINEs não são dependentes da dosagem e da suscetibilidade individual.
 - b) sua patogênese é bem estabelecida, sendo mediada por anticorpos da classe IgE.
 - c) relaciona-se com a inibição da COX-1 e aumento da síntese de leucotrienos cisteínicos.
 - d) associa-se com aumento de liberação de PGE₂ pelos basófilos.
- 5. No tratamento da asma induzida por aspirina, é correto afirmar:**
 - a) os beta 2 agonistas de longa ação devem ser evitados pelo risco de complicações cardiovasculares.
 - b) o paracetamol é o analgésico mais indicado, por sua ação preferencial na COX-3.
 - c) o uso de inibidores seletivos da COX-2 parece não reduzir a incidência de reações adversas.
 - d) é necessário considerar dessensibilização ao ácido acetilsalicílico nos pacientes que requerem uso crônico de corticosteróides inalados.
- 6. Em relação às urticárias por AINE, é correto afirmar:**
 - a) uma parcela dos pacientes pode apresentar reações exclusivamente por um específico AINE, provavelmente mediadas por mecanismo imunológico.
 - b) os AINEs são contra-indicados para pacientes com urticária crônica, devido ao risco de anafilaxia.
 - c) os testes de provocação oral são obrigatórios para seu diagnóstico.
 - d) diferentemente do observado para a asma induzida por aspirina, os pacientes com urticária usualmente respondem satisfatoriamente à dessensibilização.
- 7. Sobre o eritema pigmentar fixo ou erupção fixa a droga:**
 - a) caracteriza-se por múltiplas lesões eritemato-bolhosas bem delimitadas.
 - b) acometem preferencialmente as regiões palmares e plantares.
 - c) tende a se exacerbar mesmo com a retirada da droga.
 - d) são confirmados pelo teste de provocação oral.
- 8. Nas reações cutâneas aos AINEs, é correto afirmar:**
 - a) os coxibes são os mais envolvidos nas reações de fotossensibilidade.
 - b) sensibilização tópica aos AINEs é comum, especialmente pelo diclofenaco.
 - c) há relatos de necrólise epidérmica tóxica e de Stevens-Johnson pelos AINEs.
 - d) nas reações de fotossensibilidade, a via de exposição é cutânea com mecanismo de resposta alérgico.

Respostas corretas do teste sobre Educação Médica Continuada “Urticárias físicas” publicado na revista da SBAI volume 31, nº 6, 2008, páginas 220 a 226

Respostas corretas: 1) c; 2) c; 3) d; 4) a; 5) d; 6)d; 7) a; 8) c